

# RÉAGIR EN CAS DE CONVULSIONS

- Allonger l'enfant sur le côté, éviter qu'il ne se blesse en faisant de la place autour de lui.
- Rester calme.
- Préparer l'injection de Valium intra-rectal :
  - Prendre une ampoule de Valium (2 ml = 10 mg),
  - Casser l'ampoule à l'aide d'un coton en prenant appui sur le point bleu noté sur l'ampoule,
  - Prélever la dose adaptée au poids de l'enfant à l'aide de la seringue :

Poids (kg)	Valium en ml	Poids (kg)	Valium en ml
5 kg	0,5 ml	13 kg	1,3 ml
6 kg	0,6 ml	14 kg	1,4 ml
7 kg	0,7 ml	15 kg	1,5 ml
8 kg	0,8 ml	16 kg	1,6 ml
9 kg	0,9 ml	17 kg	1,7 ml
10 kg	1 ml	18 kg	1,8 ml
11 kg	1,1 ml	19 kg	1,9 ml
12 kg	1,2 ml	20 kg et plus	2 ml (= 1 ampoule)

- Aspirer un peu d'air (1 ml).
- Adapter la canule rectale sur la seringue.
- Injecter le Valium intra-rectal si la crise dure plus de 5 minutes ou si votre enfant fait de nombreuses crises répétées (même si elles sont brèves) :
  - Injecter le Valium et l'air de façon à ce que celui-ci pousse le produit,
  - La crise doit céder en 5 minutes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez répéter l'injection intra-rectale à la même dose (2 injections MAXIMUM par 24 heures).
- Votre enfant risque d'être somnolent après cette injection, ce n'est pas un signe de gravité.
- Penser à prendre le Valium et le matériel lors des sorties ou des vacances.